

# 26. Fisiopatologia del ricambio di acqua e sodio

III edizione print edition

Luigi Barbieri



(vedi singoli sotto-capitoli)

26. Fisiopatologia del ricambio di acqua e sodio.....	821	26.4. CLASSIFICAZIONE DELLE ALTERAZIONI DEL SODIO E DELL'ACQUA	834
26.1. FISILOGIA DEL RICAMBIO DELL'ACQUA E DEL SODIO	823	26.5. EDEMA	835
26.1.1. Bilancio dell'acqua.....	824	26.5.1. Vari aspetti di edema.....	837
26.1.2. Bilancio del sodio.....	825	26.6. DEPLEZIONE DI VOLUME	838
26.1.3. L'asse rene-surrene-ipotalamo.....	826	26.6.1. Patogenesi.....	838
26.1.4. Il sistema renina-angiotensina-aldosterone.....	827	26.6.2. Perdite extra-renali.....	839
26.1.5. Trasudato.....	827	26.6.3. Perdite renali anomale.....	840
26.1.6. Espansione di volume.....	828	26.7. IPO-NATRIEMIA	842
26.2. SODIO	829	26.7.1. Fattori per una normale escrezione urinaria di acqua.....	842
26.2.1. Concentrazione e contenuto di sodio.....	829	26.7.2. Secrezione inappropriata di ADH.....	843
26.2.2. Equilibrio osmotico.....	830	26.7.3. Principali sindromi con ipo-natriemia.....	843
26.3. RUOLO DELL'ORMONE ANTI-DIURETICO ADH	831	26.7.4. Compartimenti fluidi nell'ipo-natriemia.....	844
26.3.1. Variazioni di osmolalità e volume.....	832	26.7.5. Insufficienza corticosurrenalica.....	845
26.3.2. Osmolalità.....	832	26.7.6. Ipo-natriemia da diuretici.....	846
26.3.3. Variazioni di volume.....	833	26.7.7. Effetti dell'ipo-natriemia e della sua correzione sul cervello.....	847
26.3.4. Natriemia.....	833	26.8. IPER-NATRIEMIA	848

26.8.1. Compartimenti fluidi nell'iper-natriemia.....	848	26.9. PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE	850
26.8.2. Effetti dell'iper-natriemia sul cervello ed adattamento.....	849		



## 26.1. Fisiologia del ricambio dell'acqua e del sodio

Sia fisiologicamente sia clinicamente il sodio e l'acqua sono intimamente correlati nel loro metabolismo/ricambio

- mentre il metabolismo di una sostanza data prevede che la sua molecola sia variamente modificata dalle reazioni chimiche cellulari, il ricambio parla invece di ingressi e uscite dal sistema senza modificazioni molecolari




Figura 26.1. Regolazione dell'acqua a livello integrato  
 ADH: anti diuretic hormone (ormone antidiuretico)  
 VEAE: volume ematico arterioso efficace; ANF: atrial natriuretic factors (fattori natriuretici atriali o peptidi natriuretici atriali)




Figura 26.2. ADH: struttura

### Definizioni

**Volume ematico centrale** è il volume ematico nel cuore e nei grossi vasi intorno al cuore dove si trovano una serie di sensori allo stiramento

**Volume ematico arterioso efficace** è il volume ematico che viene avvertito dai vari sensori (centrali, renali, cerebrali): può non corrispondere al volume ematico reale

### 26.1.1. BILANCIO DELL'ACQUA




Figura 26.3. Bilancio di ingressi e uscite dell'acqua. Valori riferiti a condizioni standard di temperatura e umidità per un soggetto normale a riposo  
 Il ricambio giornaliero di acqua è complessivamente del 8-9%

**26.1.2. BILANCIO DEL SODIO**

Il contenuto di sodio dell'organismo dipende dall'equilibrio tra

- introduzione di sodio con l'alimentazione
- escrezione renale di sodio

In condizioni normali, le perdite di sodio extra-renali sono trascurabili

**Escrezione renale del sodio**

L'escrezione renale di sodio è strettamente regolata per adeguarla all'apporto sodico alimentare

Nell'individuo sano il contenuto di sodio dell'organismo rimane quasi costante, anche in presenza di grandi variazioni di apporto alimentare di sodio

L'escrezione renale di sodio è regolata da:

- eccessi o deficit di sodio che tendono a produrre variazioni nel volume ematico centrale
- recettori negli atri, nelle grosse arterie e nell'apparato iuxta-glomerulare, sono stimolati da variazioni locali della pressione che esprimono il volume ematico arterioso efficace
- ridotto volume efficace che induce ritenzione di sodio

- Deplezione di volume: il flusso ematico renale si riduce a causa della diminuita gittata cardiaca
- Espansione del volume: innesca una serie di meccanismi che favoriscono la natriuresi

**Riassorbimento del sodio**

Il riassorbimento tubulare distale è favorito dall'aldosterone che viene secreto in misura maggiore in risposta alla stimolazione della ghiandola surrenale da parte dell'angiotensina

**26.1.3. L'ASSE RENE-SURRENE-IPOTALAMO**

Figura 26.4. Apparato iuxta-glomerulare. Liberamente tratto da Guyton (2006)

L'apparato iuxta-glomerulare è formato da:

- cellule iuxta-glomerulari che si affacciano sull'arteriola afferente
- cellule iuxta-glomerulari che si affacciano sull'arteriola efferente
- macula densa che si affaccia sul tubulo distale

La sua localizzazione anatomica consente una integrazione tra i dati su

- volume/pressione
- osmolarità / rapporto tra le concentrazioni  $[K^+/Na^+]$  nel tubulo/interstizio




Figura 26.5. Schema anatomico di reni e surrenali

Le surrenali sono formate da una midollare (sistema nervoso autonomo) e da una corticale (sistema endocrino, asse ipotalamo-ipofisi-surreni)







Figura 26.6. Aldosterone



**26.1.4. IL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONE***Figura 26.7. Sistema renina-angiotensina-aldosterone*

Il controllo sulla produzione di renina avviene a feed-back su

- pressione
- riassorbimento di sodio

**26.1.5. TRASUDATO***Figura 26.8. Formazione del trasudato: scambio di fluidi a livello capillare*

Il trasudato è il liquido che attraversa una parete capillare con permeabilità intatta: peso specifico <1012, poche proteine, soprattutto albumina, e poche cellule

**26.1.6. ESPANSIONE DI VOLUME**

L'espansione di volume extra-cellulare genera:

- variazioni nell'emodinamica renale
- diverse regolazioni del trasporto tubulare
- secrezione di uno o più ormoni natriuretici

Ormoni (peptidici) natriuretici sono presenti in:

- atri cardiaci
- cervello

Le prostaglandine e le chinine secrete dal rene riducono il riassorbimento di sodio nei segmenti distali del nefrone

La molteplicità dei meccanismi di regolazione evita che alterazioni di un singolo meccanismo modifichino in misura rilevante la regolazione dell'escrezione di sodio

- es.: l'aumentata secrezione di aldosterone determina solo una ritenzione di sodio limitata e transitoria, poiché l'accumulo iniziale di sodio tende a provocare un aumento della filtrazione glomerulare e innesca l'azione antagonista di fattori natriuretici che riducono il riassorbimento tubulare di sodio

## 26.2. Sodio





Figura 26.9. Distribuzione del sodio


- La composizione del plasma può essere considerata rappresentativa dell'intero compartimento extra-cellulare
- Circa il 40% del sodio totale è localizzato nel tessuto osseo e non partecipa alla maggior parte dei processi fisiologici: viene quindi considerato non disponibile

### 26.2.1. CONCENTRAZIONE E CONTENUTO DI SODIO

 Tabella 26.1. Concentrazione e contenuto di sodio in un individuo di 70 kg


volume extra-cellulare	volume intra-cellulare
<ul style="list-style-type: none"> <li>● concentrazione plasmatica di sodio: 140 mmol/L</li> <li>● sodio extra-cellulare: 2000 mmol totali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● concentrazione intra-cell. di sodio &lt; 5 mmol/L</li> <li>● sodio intra-cellulare: 100-150 mmol totali</li> </ul>
ne deriva: <ul style="list-style-type: none"> <li>● il volume extra-cellulare totale: 20% del peso</li> <li>● volume plasmatico: 5%</li> <li>● volume dei liquidi interstiziali: 15%</li> </ul>	ne deriva: <ul style="list-style-type: none"> <li>● il volume del liquido intra-cellulare: 40% del peso</li> </ul>


### 26.2.2. EQUILIBRIO OSMOTICO

 I sali di sodio sono responsabili di più del 90% della osmolalità del liquido extra-cellulare

Le variazioni nella concentrazione plasmatica di sodio si traducono quindi in variazioni equivalenti della osmolalità plasmatica

Eccezioni a questa regola sono dovute ad accumulo di altri soluti osmoticamente attivi nel plasma

 Sebbene le composizioni in elettroliti dei liquidi intra-cellulare ed extra-cellulare siano marcatamente differenti, essi si trovano sempre in equilibrio osmotico, perché l'acqua si muove rapidamente attraverso le membrane cellulari fino ad annullare ogni gradiente osmotico


 Di conseguenza, la concentrazione plasmatica di sodio è un indice del rapporto tra soluti totali dell'organismo e acqua totale corporea

#### Definizioni

*Osmolarità: moli di soluto per litro di soluzione*

*Osmolalità: moli di soluto per kg di solvente*

### 26.3. Ruolo dell'ormone anti-diuretico ADH

 L'osmolalità plasmatica viene regolata da un meccanismo molto efficace che coinvolge vari organi distanti tra loro:

- ipotalamo
- neuroipofisi
- rene
- surrene

Il ruolo effettore centrale viene svolto dall'ormone antidiuretico ADH





Figura 26.10. Schema anatomico di ipotalamo e talamo


#### 26.3.1. VARIAZIONI DI OSMOLALITÀ E VOLUME

 Osmolalità e volume: i due parametri sono regolati l'uno a scapito dell'altro

- *l'osmolalità è il parametro dominante sino a variazioni di volume pari al 10 %*
- *quando le variazioni di volume superano il 10 %, è il volume il parametro dominante, anche a scapito dell'osmolalità*

#### 26.3.2. OSMOLALITÀ

 Gli osmocettori ipotalamici possono avvertire variazioni dell'osmolalità plasmatica del 2% o meno. Piccoli incrementi dell'osmolalità stimolano la secrezione di ormone anti-diuretico (ADH) da parte della neuroipofisi, mentre piccole diminuzioni riducono la secrezione dell'ormone.

 L'osmolalità plasmatica normale varia tra 280 e 300 mosmol/kg di acqua; il livello preciso viene determinato dalla soglia degli osmocettori in un dato individuo.

Quando la secrezione di ADH è massima il volume urinario sarà di circa 500 mL/die e l'osmolalità urinaria sarà compresa tra 800 e 1400 mosmol/kg.

In assenza di ADH l'osmolalità urinaria minima è di 40-80 mosmol/kg e la diuresi acquosa massima può raggiungere 15-20 L/die o più.

La capacità di questo sistema è sufficiente a mantenere l'osmolalità plasmatica entro limiti stretti nonostante le ampie variazioni di volume e di concentrazione dei liquidi alimentari.

### 26.3.3. VARIAZIONI DI VOLUME

- 👉 La secrezione di ADH viene regolata anche da variazioni del volume extra-cellulare
  - Una riduzione del 10% o più può stimolare la liberazione di ADH anche in assenza di variazioni della osmolalità plasmatica
  - Se la riduzione di volume è sufficientemente marcata (>10%), la stimolazione del ADH può sovrapporre i segnali osmotici e provocare ritenzione di acqua nonostante la diluizione dei liquidi corporei
  - All'opposto, l'espansione di volume extra-cellulare tende a sopprimere la secrezione di ADH anche se i liquidi corporei sono ipertonici
- 👉 Il contenuto di sodio del liquido extra-cellulare determina il volume extra-cellulare anche attraverso il cloro che segue il sodio in un equilibrio di cariche

### 26.3.4. NATRIEMIA

- 👉 Variazioni della concentrazione plasmatica di sodio (natriemia) riflettono un'alterata regolazione dell'escrezione di acqua e non solo variazioni del contenuto totale di sodio corporeo
- 👉 Dal punto di vista clinico, la natriemia non dà informazioni sul contenuto di sodio dell'organismo
  - il contenuto totale di sodio dell'organismo è determinato dal volume extra-cellulare e dalla sua concentrazione di sodio
  - si può avere iper-natriemia oppure ipo-natriemia in presenza di contenuto totale di sodio ridotto, normale e aumentato

## 26.4. Classificazione delle alterazioni del sodio e dell'acqua

- 👉 Deficit ed eccessi di sodio e acqua si verificano in una grande varietà di condizioni cliniche
- 👉 In teoria, le alterazioni del metabolismo di sodio e acqua possono essere classificate in 4 categorie:

- |                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ● <i>edema</i>                                | ● <i>ipo-natriemia</i>  |
| ● <i>deplezione di volume extra-cellulare</i> | ● <i>iper-natriemia</i> |

in pratica queste alterazioni raramente si presentano isolate

- 👉 Il primitivo eccesso di sodio dà luogo a edema. Generalmente non è considerato un'alterazione elettrolitica ma una manifestazione di malattie di base come:
  - insufficienza cardiaca congestizia
  - cirrosi epatica
  - sindrome nefrosica
- 👉 Il primitivo deficit di sodio è quasi sempre accompagnato da deplezione di acqua, inducendo così la sindrome clinica di deplezione di volume extra-cellulare
  - L'aumento assoluto o relativo di acqua produce ipo-natriemia
  - La deplezione assoluta o relativa di acqua produce iper-natriemia

## 26.5. Edema

☞ La formazione dell'edema richiede due meccanismi:

- periferico dove avvengono gli scambi tra interstizio e plasma
- centrale per la ritenzione idrico-salina che deve fornire il liquido necessario per l'accumulo

☞ Nella formazione dell'edema intervengono vari distretti


- circolo
- rene
- periferia
- sistema nervoso centrale

☞ Il parametro centrale di questa regolazione è il volume ematico arterioso efficace

n.b.: Attenzione a cattive traduzioni in effettivo dall'equivalente inglese effective. In italiano il significato di effettivo è molto diverso e non corrisponde all'inglese effective




Figura 26.11. Il cosiddetto **pitting oedema**. Immagine con licenza CCASA Heilman (2010) in [wikipedia commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pitting_Edema.jpg)





**26.5.1. VARI ASPETTI DI EDEMA**

Figura 26.13. Ascite con ittero  
Da: liverinfo.org uk

**26.6. Deplezione di volume** 

☞ Nella deplezione di volume i deficit combinati di sodio e acqua sono molto più frequenti dei deficit isolati di uno solo dei due costituenti

**26.6.1. PATOGENESI**

☞ L'eliminazione del sodio dalla dieta non dà luogo da sola a deplezione di sodio se la funzione renale è normale, perché l'escrezione renale di sodio cadrà rapidamente a livelli molto bassi

Infatti, la deplezione di sodio è dovuta a:

● **perdite extra-renali**

- gastrointestinali
- cutanee

● **perdite renali anormali**

- malattia renale
- causa extra renale

### 26.6.2. PERDITE EXTRA-RENALI

#### Perdite gastrointestinali

☞ La causa più comune di deplezione di volume è la perdita di buona parte dei liquidi gastrointestinali secreti giornalmente (di norma 8-10 L)

Poiché la concentrazione di sodio di questi liquidi è elevata, la loro perdita provoca deficit associati di sodio e acqua

Dato che i secreti più cospicui contengono in grande quantità

- potassio
- ioni idrogeno o bicarbonato

la deplezione di volume dovuta a perdite gastrointestinali è spesso associata a:

- deplezione di potassio
- acidosi o alcalosi

☞ Una deplezione notevole di volume può essere causata dal sequestro di secreti gastrointestinali all'interno di un tratto ostruito o nel cavo peritoneale in caso di peritonite

Il rapido riaccumulo di ascite dopo paracentesi può ridurre il volume ematico circolante effettivo

#### Perdite cutanee

☞ La concentrazione di sodio nel sudore varia da 5 a 50 mmol/L, aumentando in caso di maggiore sudorazione e nell'insufficienza surrenale

Poiché il sudore è sempre una soluzione ipotonica, una sudorazione profusa porta a un deficit di acqua sproporzionato alle perdite di sodio

Nelle ustioni la perdita della funzione contenitiva ed il danno dei capillari può produrre un sequestro di grandi quantità di sodio e acqua nell'area di cute colpita

### 26.6.3. PERDITE RENALI ANOMALE

☞ Perdite eccessive di sodio e acqua con l'urina possono verificarsi in:

- malattie renali acute
- malattie renali croniche

#### Malattie renali acute

☞ All'inizio della fase di guarigione (fase diuretica) dell'insufficienza renale acuta, la concentrazione urinaria di sodio tende a essere elevata (da 50 a 100 mmol/L) e possono conseguire deficit notevoli di sodio e di acqua

Perdite combinate di sodio e di acqua acute dovute a danno tubulare si possono verificare subito dopo risoluzione di un'ostruzione prolungata delle vie urinarie

#### Insufficienza renale cronica

☞ I pazienti con insufficienza renale cronica hanno una limitata capacità di ridurre l'escrezione di sodio e di acqua in risposta a un diminuito apporto

Sviluppano progressivamente deplezione di volume se l'apporto è ridotto a causa di

- anoressia, nausea, vomito caratteristico dell'uremia
- per prescrizione da parte del medico

Possono crearsi insidiosamente deficit importanti nel giro di molti giorni o mesi

Ne può risultare un "circolo vizioso" in cui la deplezione di volume tende a peggiorare ulteriormente la funzione renale

---

## Perdite con funzione renale normale

---

☞ Si possono avere perdite renali di sodio con normale funzione renale:

- somministrazione continua di potenti diuretici
- diuresi osmotica obbligata
- ipo-aldosteronismo

☞ **Deplezione di sodio dovuta a somministrazione continua di diuretici**

È la deplezione di sodio dovuta a somministrazione continua di diuretici a dosi elevate anche dopo la risoluzione degli edemi, o in pazienti i cui edemi sono "sequestrati" e non possono essere mobilizzati

Es.: il tentativo terapeutico in pazienti cirrotici con ascite di ridurre il volume di liquido ascitico (paracentesi) può dare luogo a deplezione del volume extra-cellulare più che mobilizzare il liquido ascitico stesso

☞ **Diuresi osmotica obbligata**

L'esempio clinico più comune è la glicosuria marcata nel diabete mellito non controllato dalla terapia

Una frequente causa iatrogena è la somministrazione di diuretici osmotici come il mannitolo

In pazienti che assumono un'alimentazione enterale o parenterale a elevato contenuto di proteine la deplezione di volume può essere dovuta a diuresi osmotica dell'urea formatasi nel metabolismo proteico

☞ **Ipo-aldosteronismo**

Si verificano nel morbo di Addison e nell'ipo-aldosteronismo dovuto a deficit di mineralcorticoidi

---

---

## 26.7. Ipo-natriemia

---

☞ L'ipo-natriemia indica che liquidi dell'organismo contengono una quantità di acqua in eccesso rispetto alla quantità di soluti

- ipo-natriemia non significa deplezione di sodio, anche se è una delle condizioni il cui può presentarsi
  - la maggior parte dei tipi di ipo-natriemia sono il risultato di un'insufficiente diluizione dell'urina
- 

### 26.7.1. FATTORI PER UNA NORMALE ESCREZIONE URINARIA DI ACQUA

---

☞ La risposta a un'eccessiva diluizione dei liquidi è l'aumento dell'escrezione urinaria di acqua

Perché si abbia una normale escrezione urinaria di acqua è necessario l'intervento di 3 fattori:

- deve essere ridotta la secrezione di ADH
- una sufficiente quantità di acqua e di sodio deve raggiungere i segmenti di diluizione del nefrone, nel tratto ascendente dell'ansa di Henle e nel tubulo contorto distale
- questi segmenti del nefrone devono funzionare, riassorbendo sodio e restando impermeabili all'acqua

☞ 3 meccanismi possono rendere insufficienti l'escrezione urinaria di acqua nei pazienti con ipo-natriemia:

- iniezione inappropriata di ADH
  - apporto insufficiente di liquido tubulare al nefrone distale
  - insufficienti trasporto del sodio od impermeabilità all'acqua
-

### 26.7.2. SECREZIONE INAPPROPRIATA DI ADH

☞ Malgrado l'ipotonicità del liquido extra-cellulare la secrezione di ADH può continuare "inappropriatamente". Questo può essere dovuto a:

- una incontrollata liberazione di ADH da parte di neoplasie
- stimolazione non osmotica della secrezione di ADH (es.: farmaci neurolettici)
- deplezione di volume
- fattori nervosi come il dolore e le emozioni

### 26.7.3. PRINCIPALI SINDROMI CON IPO-NATRIEMIA

☞ L'ipo-natriemia è presente in molte condizioni cliniche diverse:

- insufficienza corticosurrenale
- ipo-natriemia da diuretici
- polidipsia psicogena
- ipo-natriemia essenziale
- ipo-natriemia dovuta ad accumulo di soluti osmoticamente attivi
- artefatti

### 26.7.4. COMPARTIMENTI FLUIDI NELL' IPO-NATRIEMIA




Figura 26.14. Compartimenti fluidi nell'ipo-natriemia. I pallini rossi rappresentano il sodio, quelli blu il potassio. I pallini verdi indicano piccoli soluti permeabili, le forme verdi più grandi rappresentano soluti impermeabili. Liberamente tratto da Adroguè (2000b)

- Nella sindrome da inappropriata secrezione di ADH si espandono i volumi sia del liquido extra-cellulare, sia quello intra-cellulare (b)
- La ritenzione di acqua può condurre a ipo-natriemia ipotonica senza la attesa ipo-osmolalità in pazienti che hanno accumulato altre osmoli (urea) (c)
- Uno shift dell'acqua dal compartimento intra-cellulare al compartimento extra-cellulare, dovuto ai soluti confinati nello spazio extra-cellulare, da origine ad una ipo-natriemia ipertonica (d)
- La deplezione di sodio (con ritenzione secondaria di acqua) induce una contrazione del volume extra-cellulare ed una espansione del volume intra-cellulare (e)

**26.7.5. INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALICA**

☞ Ci sono tre classi di ormoni surrenalici:

- mineralcorticoidi (aldosterone)
- glucocorticoidi (cortisolo)
- ormoni ad attività sessuale (androgeni, estrogeni, progestinici)

Sono simili strutturalmente: ogni classe ha un poco dell'attività delle altre

☞ Durante la sintesi e nella degradazione si formano composti intermedi ad attività differente:

- es.: per produrre estrogeni si passa attraverso composti ad attività progestinica, poi androgenica, ed infine estrogenica




Figura 26.15. Principali classi di ormoni surrenalici

☞ L'insufficiente secrezione di ormoni mineralcorticoidi può generare deplezione di sodio per riduzione del riassorbimento tubulare, che si accompagna a:

- iper-kaliemia (deficit di escrezione renale dipendente da aldosterone)
- pigmentazione (da eventuale eccesso di ACTH)
- ipoglicemia (da deficit di glucocorticoidi)


**26.7.6. IPO-NATRIEMIA DA DIURETICI**

☞ Una molteplicità di fattori contribuisce alla genesi dell'ipo-natriemia da diuretici

- la perdita di sale può causare deplezione di volume che limita la diuresi acquosa per i meccanismi già descritti e stimola la sete
- i tiazidi e i diuretici che agiscono a livello dell'ansa di Henle (furosemide, bumetanide e acido etacrinico) inibiscono il riassorbimento di sodio nei segmenti diluenti del nefrone e, di conseguenza, limitano direttamente l'escrezione urinaria di acqua libera
- i tiazidi sembrano essere i diuretici più comunemente responsabili di ipo-natriemia, forse perché interferiscono con l'elaborazione di una urina ipotonica


☞ L'ipo-natriemia dovuta a terapia diuretica è frequente, ma solitamente di scarsa gravità

**26.7.7. EFFETTI DELL' IPO-NATRIEMIA E DELLA SUA CORREZIONE SUL CERVELLO**



**26.8. Iper-natriemia** 🧪🩺

**26.8.1. COMPARTIMENTI FLUIDI NELL'IPER-NATRIEMIA**




**26.8.2. EFFETTI DELL'IPER-NATRIEMIA SUL CERVELLO ED ADATTAMENTO**

Figura 26.18. Effetti dell'iper-natriemia sul cervello ed adattamento

Liberamente tratto da Adrogè (2000a)

- Entro pochi minuti dallo sviluppo di ipertonicità, la perdita di acqua dalle cellule cerebrali provoca una contrazione del loro volume. Un parziale recupero del volume si ha in poche ore per l'ingresso di elettroliti nelle cellule (adattamento rapido)
- La normalizzazione del volume cerebrale si completa in alcuni giorni come effetto dell'accumulo di osmoliti organici (adattamento lento)
- L'alta osmolarità persiste nonostante la normalizzazione del volume cerebrale
- Una correzione lenta dello stato ipertonico ristabilisce la normale osmolarità plasmatica senza ulteriori danni
- Una correzione rapida da origine ad edema cerebrale perché l'assorbimento di acqua è più veloce della dissipazione degli elettroliti e degli osmoliti organici

**26.9. Principali fonti utilizzate**

Adrogè, H.J., Madias, N.E. (2000a) Hyponatremia. *N. Engl. J. Med.* 342, 1493-1499

Adrogè, H.J., Madias, N.E. (2000b) Hyponatremia. *N. Engl. J. Med.* 342, 1581-1589

Braunwald, E. (1991) Edema. In: Wilson, J.D., Braunwald, E., Fauci, A.S., Isselbacher, K.J., Petersdorf, R.G., Martin, J.B., Fauci, A.S., Roor, R.K. (eds.) *Harrison's principles of internal medicine*. XII ed. Mc Graw Hill, New York. Pp. 228-232

Guyton, A.C., Hall, J. E. (2006) *Textbook of medical physiology*. XI ed. Elsevier Saunders, Philadelphia

Singer, G.G., Brenner, G.M. (2001) Fluid and electrolyte disturbances. In: Braunwald, E., Fauci, A.S., Kasper, D.L., Hauser, S.L., Longo, D.L., Jameson, J.L. (eds.) *Harrison's principles of internal medicine*. XV ed. Mc Graw Hill, New York. Pp. 271-283

**Siti web**

[liverinfo.org.uk](http://liverinfo.org.uk)

[pathologyvcu.edu](http://pathologyvcu.edu)

[wikipedia\\_commons\\_pitting\\_edema](http://wikipedia_commons_pitting_edema)

visitato il 12/09/2008

visitato il 12/09/2008

visitato il 28/10/2011

contenuto non più disponibile il 22/06/2011

accessibile il 19/06/2013

accessibile il 19/06/2013



